

		Investigación e Innovación.	Código	II-F-021
		FORMATO PARA RESUMEN ANALÍTICO DE INVESTIGACIÓN	Versión	01
			Vigencia	30/03/2023
			Página	1 de 6

**GESTIÓN SANITARIA Y FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS DE LA VIOLENCIA SEXUAL EN NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, 2023
(Resumen Analítico)**

**HEALTH MANAGEMENT AND SOCIODEMOGRAPHIC FACTORS OF SEXUAL VIOLENCE IN GIRLS AND ADOLESCENTS IN THE DEPARTMENT OF NARIÑO, 2023
(Analytical Summary)**

Autores (Authors): MAYA MARTINEZ YENNY STEFANY; MENDOZA IBARRA JOSE MIGUEL

Facultad (Faculty): FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD

Programa (Program): MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN EN SALUD

Asesor (Support): Mg. CÓRDOBA MORÁN MARÍA ALEJANDRA

Fecha de terminación del estudio (End of the research): DICIEMBRE, 2024

Modalidad de Investigación (Kind of research): INFORME DE INVESTIGACIÓN PARA OPTAR AL TÍTULO DE: MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN EN SALUD

PALABRAS CLAVE

DELITOS SEXUALES

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

ABUSO SEXUAL INFANTIL

ADOLESCENTE

GESTIÓN EN SALUD

GESTIÓN CLÍNICA

ADMINISTRACIÓN EN SALUD

KEY WORDS

SEX OFFENSES

VIOLENCE AGAINST WOMEN

CHILD ABUSE SEXUAL

ADOLESCENT

HEALTH MANAGEMENT

CLINICAL GOVERNANCE

HEALTH ADMINISTRATION

		Investigación e Innovación.	Código	II-F-021
		FORMATO PARA RESUMEN ANALÍTICO DE INVESTIGACIÓN	Versión	01
			Vigencia	30/03/2023
			Página	1 de 6

RESUMEN:

Objetivo: Este estudio busca identificar la gestión sanitaria a través de la implementación clínica asistencial y administrativa de la ruta de atención integral para víctimas de violencia sexual en el Departamento de Nariño en el año 2023.

Materiales y Métodos: Se utilizó un enfoque cuantitativo y observacional descriptivo, basado en datos de las fichas de notificación del Instituto Nacional de Salud (INS) y listas de chequeo del Protocolo de Atención Integral en Salud. La población incluyó a 188 mujeres de entre 2 y 19 años, atendidas en 27 Empresas Sociales del Estado (ESE) auditadas en 2023. Se realizó un análisis descriptivo de las variables relacionadas con la atención asistencial y las condiciones administrativas.

Resultados: A pesar de la disponibilidad de recursos, la implementación de intervenciones clave fue inconsistente. El 100% de los nodos reportaron disponibilidad de anticoncepción de emergencia, pero menos del 50% de los casos recibieron profilaxis adecuada dentro de las 72 horas. La atención psicológica fue amplia, aunque con deficiencias en algunos nodos, como el nodo Occidente. La remisión a sectores de protección fue buena, pero a justicia fue baja, con solo un 33% en el nodo Centro. La profilaxis, como anticoncepción de emergencia y VIH, presentó cumplimiento insuficiente en algunos nodos.

Conclusiones: A pesar de los recursos y protocolos, la implementación de la ruta de atención integral presenta inconsistencias que afectan la efectividad ante la violencia sexual. Es necesario mejorar la coordinación interinstitucional, la capacitación del personal y fortalecer el acceso a la justicia y la intervención.

ABSTRACT:

***Objective:** This study seeks to identify the health management through the clinical care and administrative implementation of the comprehensive care route for victims of sexual violence in the Department of Nariño in the year 2023.*

***Materials and Methods:** A quantitative and observational descriptive approach was used, based on data from the notification forms of the National Institute of Health (INS) and checklists of the Comprehensive Health Care Protocol. The population included 188 women between 2 and 19 years of age, attended in 27 State Social Enterprises (ESE) audited in 2023. A descriptive analysis of variables related to health care and administrative conditions was performed.*

***Results:** Despite the availability of resources, the implementation of key interventions was inconsistent. 100% of nodes reported availability of emergency contraception, but less than 50% of cases received adequate prophylaxis within 72 hours. Psychological care was ample, although with deficiencies in some nodes, such as the West node. Referral to protection sectors was good, but to justice was low, with*

		Investigación e Innovación.	Código	II-F-021
		FORMATO PARA RESUMEN ANALÍTICO DE INVESTIGACIÓN	Versión	01
			Vigencia	30/03/2023
			Página	1 de 6

only 33% in the Centro node. Prophylaxis, such as emergency contraception and HIV, presented insufficient compliance in some nodes. Conclusions: Despite resources and protocols, the implementation of the comprehensive care route presents inconsistencies that affect effectiveness in the face of sexual violence. It is necessary to improve inter-institutional coordination, staff training and strengthen access to justice and intervention

CONCLUSIONES:

La violencia sexual afecta principalmente a mujeres adolescentes entre 12 y 19 años, siendo las escolares las más vulnerables, con una distribución de casos similar entre áreas urbanas y rurales. Los sectores socioeconómicos más vulnerables presentan una mayor cantidad de incidentes reportados, destacándose que el hogar es el lugar más frecuente de ocurrencia de estos actos, siendo los agresores mayormente familiares o amigos cercanos. Las modalidades más comunes de violencia sexual fueron el acceso carnal y los actos sexuales.

En términos geográficos, se supervisa que en los municipios del nodo norte y centro occidente del Departamento de Nariño, la tasa de violencia sexual es de aproximadamente 300 casos por cada 100.000 mujeres y niñas en el grupo de edad estudiado. Esta tasa se distribuye de manera equilibrada entre zonas urbanas y rurales, con un predominio en la afiliación subsidiada. Estos hallazgos resaltan la importancia de fortalecer las estrategias de prevención y apoyo, especialmente en los sectores más vulnerables y en los entornos familiares donde se concentra gran parte de la violencia.

Existen disparidades significativas en la atención de salud para víctimas de violencia sexual, particularmente en la disponibilidad y distribución de recursos entre nodos geográficos. Mientras algunos logran una cobertura parcial en áreas críticas como anticoncepción de emergencia y profilaxis para ITS/VIH, otros enfrentan importantes deficiencias, lo que evidencia una baja adherencia a los protocolos establecidos y afecta la calidad y oportunidad del tratamiento.

Este estudio revela que factores como el lugar de residencia, la etnia de la víctima, el parentesco con el agresor y el lugar de la agresión están estadísticamente relacionadas con los diferentes tipos de violencia sexual como acceso carnal, actos sexuales, acoso sexual y trata de personas en niñas y adolescentes en Nariño. Estos resultados destacan la importancia de considerar el contexto social y familiar en las estrategias de prevención y atención de la violencia sexual en la región.

		Investigación e Innovación.	Código	II-F-021
		FORMATO PARA RESUMEN ANALÍTICO DE INVESTIGACIÓN	Versión	01
			Vigencia	30/03/2023
			Página	1 de 6

CONCLUSIONS:

Sexual violence mainly affects adolescent females between 12 and 19 years of age, with schoolgirls being the most vulnerable, with a similar distribution of cases between urban and rural areas. The most vulnerable socioeconomic sectors present a greater number of reported incidents, with the home being the most frequent place of occurrence of these acts, with the aggressors being mostly family members or close friends. The most common modalities of sexual violence were carnal access and sexual acts.

In geographic terms, it is monitored that in the municipalities of the northern and central-western node of the Department of Nariño, the rate of sexual violence is approximately 300 cases per 100,000 women and girls in the age group studied. This rate is evenly distributed between urban and rural areas, with a predominance in the subsidized affiliation. These findings highlight the importance of strengthening prevention and support strategies, especially in the most vulnerable sectors and in family environments where much of the violence is concentrated.

There are significant disparities in health care for victims of sexual violence, particularly in the availability and distribution of resources among geographic nodes. While some achieve partial coverage in critical areas such as emergency contraception and STI/HIV prophylaxis, others face significant deficiencies, which shows low adherence to established protocols and affects the quality and timeliness of treatment.

This study reveals that factors such as place of residence, ethnicity of the victim, kinship with the aggressor and place of aggression are statistically related to different types of sexual violence such as carnal access, sexual acts, sexual harassment and human trafficking in girls and adolescents in Nariño. These results highlight the importance of considering the social and family context in sexual violence prevention and care strategies in the region.

RECOMENDACIONES:

Es fundamental que los entes gubernamentales implementen mecanismos más rigurosos de seguimiento y control sobre el cumplimiento de los protocolos de atención a víctimas de violencia sexual en las IPS. Esto incluye la creación de un sistema de auditorías periódicas y la imposición de sanciones efectivas a aquellas instituciones que no cumplan con las normativas establecidas.

		Investigación e Innovación.	Código	II-F-021
		FORMATO PARA RESUMEN ANALÍTICO DE INVESTIGACIÓN	Versión	01
			Vigencia	30/03/2023
			Página	1 de 6

Es crucial que se fortalezcan los canales de comunicación entre las autoridades de salud, justicia y protección, para asegurar una respuesta coordinada y eficiente que no solo garantice la atención adecuada a las víctimas, sino también la aplicación de las sanciones correspondientes a los responsables de estos delitos y a las instituciones que no cumplan con su deber de protección.

Implementar estrategias de información y educación a nivel comunitario, que sensibilicen sobre la importancia de reconocer y denunciar la violencia sexual. Estas actividades deben estar orientadas a aumentar la conciencia sobre los signos de abuso y violencia, proporcionando información clara y accesible sobre cómo y dónde denunciar estos delitos. Además, se recomienda involucrar a líderes comunitarios, escuelas y organizaciones locales en la difusión de estos mensajes, creando una red de apoyo comunitaria que facilite la detección temprana y la intervención rápida, garantizando que las víctimas reciban la protección y el apoyo necesario.

Se recomienda a los investigadores del ámbito de la salud continuar el estudio de gestión sanitaria en violencia sexual, incluyendo las instituciones de salud públicas de los municipios que no se incluyeron e instituciones privadas y de tercer nivel de complejidad, a fin de tener una mirada holística del fenómeno, como también la identificación integral de los procesos de gestión, atención en salud y cumplimiento del protocolo de violencia sexual para el Departamento de Nariño.

RECOMMENDATIONS:

It is essential that government agencies implement more rigorous mechanisms to monitor and control compliance with protocols for the care of victims of sexual violence in PHRs. This includes the creation of a system of periodic audits and the imposition of effective sanctions on those institutions that do not comply with the established regulations.

It is crucial to strengthen the channels of communication between health, justice and protection authorities to ensure a coordinated and efficient response that not only guarantees adequate care for victims, but also the application of the corresponding sanctions to those responsible for these crimes and to the institutions that do not comply with their duty to protect.

Implement information and education strategies at the community level that raise awareness of the importance of recognizing and reporting sexual violence. These activities should be aimed at increasing awareness of the signs of abuse and violence, providing clear and accessible information on how and where to report these crimes. In addition, it is recommended to involve community leaders, schools and local organizations in the dissemination of these messages, creating a

		Investigación e Innovación.	Código	II-F-021
		FORMATO PARA RESUMEN ANALÍTICO DE INVESTIGACIÓN	Versión	01
			Vigencia	30/03/2023
			Página	1 de 6

community support network that facilitates early detection and rapid intervention, ensuring that victims receive the necessary protection and support.

It is recommended that health researchers continue the study of health management in sexual violence, including public health institutions in the municipalities that were not included and private and third level of complexity institutions, in order to have a holistic view of the phenomenon, as well as the comprehensive identification of management processes, health care and compliance with the sexual violence protocol for the Department of Nariño.